



دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام
مجله تحقیق و توسعه سلامت
دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۴



استرس مزمن و تأثیر آن بر سیستم ایمنی، آسیب پذیری در برابر عفونت‌ها و سرطان‌ها: یک مطالعه مروری روایی

محمد بهرامی (MSc)^۱، مسعود حسن زاده ماکوئی (PhD)^{۲*}

مقاله مروری

چکیده

سابقه و هدف: استرس مزمن یکی از عوامل مهم مؤثر بر سلامت عمومی است که با ایجاد تغییرات فیزیولوژیک پایدار، نه تنها وضعیت روانی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در تضعیف عملکرد سیستم ایمنی دارد. هدف از این مطالعه، مرور و تحلیل آخرین شواهد علمی در زمینه ارتباط بین استرس مزمن، عملکرد ایمنی و آسیب‌پذیری بدن در برابر عفونت‌ها و سرطان‌ها است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مروری، مقالات انگلیسی و فارسی منتشرشده در سال‌های اخیر با استفاده از کلیدواژه‌های مرتبط با استرس مزمن، عملکرد ایمنی، عفونت‌ها و سرطان‌ها مورد جست‌وجو و بررسی تحلیلی قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج مطالعات نشان می‌دهند که استرس مزمن با اختلال در محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال و سیستم عصبی سمپاتیک، عملکرد ایمنی را تضعیف کرده و باعث افزایش التهاب، حساسیت به سرطان، بیماری‌های خودایمنی و عفونت می‌شود. استرس مزمن می‌تواند تعادل میکروگلیا و آستروسیت‌ها را در مغز به هم زده و رفتارهای افسردگی و اضطراب ایجاد کند. همچنین، استرس پری‌ناتال مسیرهای سیگنال‌دهی PI3K/Akt/NF-KB را فعال کرده و تعادل Th17/Treg در فرزندان را مختل می‌کند.

نتیجه‌گیری: استرس مزمن با القای التهاب سیستمیک، سرکوب ایمنی محافظتی و تحریک فرایندهای خودایمنی، بدن را در برابر عفونت‌ها و سرطان‌ها آسیب‌پذیرتر می‌سازد. درک عمیق‌تر از مکانیسم‌های ایمنی-عصبی مرتبط با استرس مزمن می‌تواند زمینه‌ساز توسعه راهکارهای پیشگیرانه و درمانی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی باشد.

واژه‌های کلیدی: استرس مزمن، ایمونولوژی، سرطان، عفونت، خودایمنی

تلفن: ۰۲۴۳۳۱۴۰۳۰۰

E-mail: dr.m.makoui@zums.ac.ir

*نویسنده مسئول: دکتر مسعود حسن زاده ماکوئی

۱- کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

۲- گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

پذیرش: ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

اصلاح: ۱۴۰۴/۰۷/۰۴

دریافت: ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

مقدمه

استرس مزمن یکی از چالش‌های مهم سلامت عمومی است که نه تنها کیفیت زندگی روانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بر عملکرد سیستم ایمنی نیز اثرات چشمگیری دارد. مواجهه طولانی‌مدت با استرس روانی باعث افزایش تولید هورمون‌هایی مانند کورتیزول و آدرنالین شده، عملکرد لنفوسیت‌ها و ماکروفاژها را مختل کرده و پاسخ‌های ایمنی ذاتی و اکتسابی را سرکوب می‌کند. مطالعه Balakin و همکاران، به نقش محوری محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA) و تعادل Cytokine ها در سرکوب عملکرد ماکروفاژها و لنفوسیت‌ها در اثر استرس مزمن اشاره شده است (۱). علاوه بر این، یافته‌های مطالعه‌ای دیگر نشان می‌دهند که میزان استرس تجمع‌ی فیزیولوژیکی در افراد سالم با تغییراتی در زیرمجموعه‌های سلول‌های T همراه است که مشابه آنچه در فرایند پیری ایمنی مشاهده می‌شود - مانند کاهش لنفوسیت‌های نایو و افزایش سلول‌های تمایز یافته - است (۲). این یافته‌ها نشان می‌دهند استرس مزمن می‌تواند روند پیری سیستم ایمنی را تسریع کند. نتایج مطالعه‌ای که توسط Reed و همکاران انجام شده، نشان می‌دهد افراد مسن که در مواجهه با استرس‌های زندگی از راهبرد بازتفسیر شناختی (cognitive reappraisal) استفاده کرده‌اند، کاهش‌های مرتبط با عملکرد سیستم ایمنی را کمتر تجربه کرده‌اند؛ به‌ویژه در شاخص‌هایی مانند IL-6 و جمعیت سلول‌های کشنده طبیعی (NK) (۳). بنابراین علاوه بر تأثیرات مضر، امکان کاهش این اثرات با مداخلات روانشناختی وجود دارد. همچنین، بررسی‌های جدید نشان می‌دهند استرس مزمن به تشدید واکنش التهابی در بیماری‌های خودایمنی مانند روماتوئید آرتریت و پسونیازیس منجر می‌شود. مطالعه Chaudhary و همکارانش بیان می‌کند که استرس مزمن باعث افزایش نشانگرهای التهابی و اختلال در تعادل عوامل اکسیداتیو شده است که می‌تواند پیشرفت بیماری را تسریع کند (۴). با توجه به این شواهد، به نظر می‌رسد استرس مزمن نه تنها ایمنی را تضعیف می‌کند، بلکه بدن را در برابر عفونت‌ها

آسیب‌پذیرتر می‌سازد. این موضوع اهمیت دارد که اقدامات پیشگیرانه و مداخلات روانشناختی به‌صورت مؤثر بررسی شوند تا بتوان تأثیرات منفی استرس بر ایمنی را کاهش داد و سلامت عمومی را ارتقا بخشید. هدف از این مطالعه، مرور و تحلیل آخرین شواهد علمی در زمینه ارتباط بین استرس مزمن، عملکرد ایمنی و آسیب‌پذیری بدن در برابر عفونت‌ها و سرطان‌ها است.

مواد و روش‌ها

این مطالعه به‌صورت مروری-توصیفی کوتاه انجام شد. برای گردآوری داده‌ها، جستجوی نظام‌مند در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر شامل PubMed، Scopus و Web of Science در بازه زمانی چند سال اخیر انجام گرفت. کلیدواژه‌های مورد استفاده عبارت بودند از chronic stress، immune function، immune suppression، infection susceptibility. مقالات انگلیسی‌زبان منتشرشده در مجلات معتبر علمی که دسترسی کامل به متن آن‌ها امکان‌پذیر بود، در مطالعه وارد شدند. در مقابل، مقالاتی که صرفاً به استرس حاد پرداخته یا فاقد داده‌های مرتبط با شاخص‌های ایمونولوژیک بودند، از مرور حذف شدند.

یافته‌ها به‌صورت کیفی استخراج شده و در قالب محورهای اصلی شامل تغییرات سلولی و مولکولی در پاسخ‌های ایمنی، افزایش شاخص‌های التهابی، و کاهش توان ایمنی در برابر عفونت‌ها و سرطان‌ها مورد سازمان‌دهی و تحلیل توصیفی قرار گرفتند.

یافته‌ها

درک پیشرفت‌های روان‌عصب-ایمونولوژی در دهه اخیر نشان داده است که استرس و سرطان ارتباط نزدیکی دارند. استرس مزمن پایدار می‌تواند تومورزایی و پیشرفت سرطان را تسریع کند و نتایج بالینی بیماران را بدتر سازد. مهم‌ترین مکانیسم شناخته‌شده در این روند، اختلال در محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال^۱ و سیستم عصبی سمپاتیک^۲ است. فعال‌سازی غیرطبیعی سیستم نوروآندوکراین با ترشح هورمون‌های مرتبط با استرس، موجب افزایش بیان انکوژن‌ها،

² SNS¹ (HPA)

تشدید التهاب مزمن و اختلال عملکرد ایمنی می‌شود. شواهد روزافزون همچنین نشان داده‌اند که مداخلات مختلف مانند داروها، ورزش و تکنیک‌های آرام‌سازی روان‌شناختی می‌توانند در کاهش اختلالات روانی و بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی مؤثر باشند (۵). استرس مزمن (CUMS) باعث فعال شدن میکروگلیا به سمت حالت التهابی (M1) می‌شود و این امر التهاب مغزی، افزایش هورمون استرس (کورتیکوسترون) و بروز رفتارهای افسردگی و اضطرابی را به دنبال دارد. در همین زمان، عملکرد آستروسیت‌ها و تولید عوامل حمایتی عصبی مثل BDNF کاهش می‌یابد. این عدم تعادل بین میکروگلیا (M1/M2) و اختلال در آستروسیت‌ها نقش کلیدی در ایجاد افسردگی دارد. درمان با مینوسیکلین توانست التهاب را کاهش دهد، عملکرد آستروسیت‌ها را بازیابی کند و رفتارهای مشابه افسردگی را بهبود بخشد (۶). در پی پاندمی کووید-۱۹، بسیاری از مردم جهان با افزایش استرس، اضطراب و حتی افسردگی مواجه شدند. ترس از ابتلا به بیماری و پیامدهای جدی آن، همراه با نگرانی‌ها و مشکلات ناشی از تأثیرات شخصی و حرفه‌ای ویروس، فشار روانی زیادی ایجاد کرده بود. تغییرات ناگهانی در سبک زندگی و شرایط روزمره، چالش‌های روزانه‌ای برای همه به همراه داشت. مطالعات نشان داده‌اند که این نوع فشارهای روانی می‌توانند عملکرد سیستم ایمنی را تحت تأثیر قرار داده و بیماری‌های التهابی مانند آلرژی و آسم را تشدید می‌کند (۷). در تحقیقات مربوط به «استرس و ایمنی»، دو نوع استرس به‌طور مجزا شناسایی می‌شوند: استرس فیزیکی و شیمیایی و استرس روانی. هر دو نوع استرس اهمیت زیادی دارند زیرا بر سلامت کلی فرد تأثیر می‌گذارند. استرس فیزیکی و شیمیایی ناشی از عوامل محیطی مانند تغذیه، سموم، اختلالات متابولیک، عفونت‌ها و التهاب است و اگر سیستم ایمنی نتواند با این فشارها مقابله کند، ممکن است منجر به بیماری یا شرایط خطرناک شود. از سوی دیگر، استرس روانی مزمن باعث افزایش طولانی‌مدت هورمون‌های کورتیزول و کورتیکواستروئید می‌شود که مقاومت به کورتیزول و اختلال در اثرات ضدالتهابی سیستم ایمنی را به دنبال دارد. این وضعیت می‌تواند موجب عفونت‌های مزمن، بیماری‌های خودایمنی التهابی، سرطان‌ها و سایر اختلالات فیزیولوژیک شود و ارتباط و شبکه‌های

سیگنال‌دهی بین سلول‌های ایمنی را نیز مهار کند (۸). مطالعه‌ای نشان داد که داروهای ضدافسردگی SSRI مانند فلوکستین و سرتالین با کاهش استرس روانی مزمن، ایمنی ضدتومور را بازگردانده و رشد و متاستاز تومورها را کاهش می‌دهند (۹). همچنین، استرس ناشی از فعال‌سازی سیستم سمپاتیک با سرکوب ایمنی تومور مرتبط است و استفاده از β -بلوکرها می‌تواند این سرکوب را معکوس کند و پاسخ به ایمنی‌درمانی‌های چک‌پوینت را بهبود بخشد (۱۰). استرس مزمن با سرکوب جنبه‌های مختلف ایمنی حفاظتی، حساسیت به سرطان را افزایش می‌دهد. در مدل طبیعی سرطان پوست (SCC) در موش‌ها، استرس مزمن رشد ضایعات پیش‌سرطانی و سرطانی را تسریع کرد. این استرس باعث کاهش بیان ژن شیموکین CTACK/CCL27 و کاهش نفوذ سلول‌های T محافظ $CD4+$ و $CD8+$ و مهار سایتوکاین‌های $Th1$ مانند $IL-12$ و $IFN-\gamma$ شد، که در مجموع منجر به سرکوب ایمنی حفاظتی گردید. علاوه بر این، استرس مزمن تعداد سلول‌های T تنظیم‌کننده ($CD4+/CD25+$) را افزایش داد و سرکوب ایمنی را تشدید کرد. موش‌های با رفتار اضطرابی بالا نیز قبل از القای تومور، دارای کورتیکوسترون بالاتر، افزایش CCL22 و نفوذ بیشتر سلول‌های T تنظیم‌کننده، کاهش CTACK/CCL27، $IL-12$ ، $IFN-\gamma$ و کاهش نفوذ $CD4+/CD8+$ در تومور بودند و VEGF بالاتری داشتند که پتانسیل آنژیوژنز و متاستاز تومور را افزایش می‌داد (۱۱). فعال‌سازی ایمنی مادر (MIA)، که به افزایش نشانگرهای التهابی فراتر از حد طبیعی اشاره دارد، می‌تواند ناشی از استرس روانی، عفونت یا اختلالات دیگر در دوران بارداری باشد و توسعه سیستم ایمنی نوزاد را تحت تأثیر قرار داده و خطر بروز اختلالات ایمنی را افزایش دهد. دریک مطالعه، موش‌های باردار تحت استرس مزمن غیرقابل پیش‌بینی (CUMS) قرار گرفتند و اثر این استرس پرناتال بر سیستم ایمنی فرزندان بررسی شد. نتایج نشان داد که مسیر سیگنال‌دهی $PI3K/Akt/NF-\kappa B$ فعال شده و تعادل سلول‌های $Th17/Treg$ در طحال فرزندان مختل شده است. علاوه بر این، سطح کورتیزول و سایتوکاین‌های التهابی ($IL-1\beta$ ، $IL-6$ ، $TNF-\alpha$) در مادران و فرزندان افزایش یافته و بیان mRNAهای مرتبط با مسیر $PI3K/Akt/NF-\kappa B$

تغییر کرده بود که ممکن است منجر به عدم تعادل Th17/Treg شود (۱۲).

بحث

استرس تأثیر قابل توجهی بر سیستم ایمنی دارد و حساسیت به بیماری و سلامت کلی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. استرس با فعال سازی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال^۳ و سیستم عصبی سمپاتیک، عملکرد و جابجایی سلول های ایمنی را در اندام های مختلف و خون تغییر می دهد. استرس حاد ممکن است به طور موقت ایمنی را تقویت کند، اما استرس مزمن باعث افزایش سطح کورتیزول و سرکوب پاسخ ایمنی می شود. علاوه بر این، استرس می تواند میکروگلیا را فعال کرده و ترشح هورمون ها و نوروترانسمیترها را افزایش دهد که بر فعالیت سلول های ایمنی تأثیر می گذارد. یافته ها نشان می دهند که سلول های ایمنی پاسخ های ژنتیکی متفاوتی به استرس نشان می دهند و این امر اهمیت مدیریت شخصی سازی شده استرس را برجسته می کند. همچنین، ارتباط بالقوه استرس مزمن با بیماری های خودایمنی نیازمند تحقیقات بیشتر است (۱۳). با بررسی چندین مطالعه انجام شده در سال های اخیر، تأثیر اساسی و مهم استرس، به ویژه استرس مزمن، بر سیستم ایمنی کاملاً مشهود است. فشار روانی شدید، اضطراب، ترس و رفتارهای روان شناختی نادرست می توانند تعادل ایمنی بدن را بر هم بزنند. از این رو، آموزش مهارت های مدیریت استرس و اضطراب، علاوه بر تأثیرات روانی، می تواند در تنظیم صحیح پاسخ های هموستاز و عملکرد ایمنی بدن نقش موثری داشته باشد. همان طور که اشاره شد، بیماری های خودایمنی (فعالیت غیرضروری سیستم ایمنی) و ناکامی در مقابله با تومورها یا عوامل عفونی (کاهش ناکافی فعالیت ایمنی) هر دو می توانند پیامدهای تنظیم نادرست و عملکرد غیراصولی سیستم ایمنی باشند. استرس با بروز یا تشدید بیماری هایی مانند مالتیپل اسکلروزیس (MS) (۱۴)، آرتریت روماتوئید (۱۵)، پسوریازیس (۱۶) و سایر اختلالات مرتبط با سیستم ایمنی ارتباط دارد. استرس مزمن به طور قابل توجهی پیشرفت اختلالات خودایمنی را تشدید می کند و اثر درمان را کاهش می دهد. در یک مطالعه،

مدل های موشی آرتریت القا شده با کلاژن و پسوریازیس القا شده با ایمنی کیمود، تحت هشت هفته استرس مزمن غیرقابل پیش بینی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استرس مزمن باعث افزایش التهاب، تخریب بافت و شدت بیماری شد و اثر داروی متوترکسات (MTX) در کاهش علائم بیماری کاهش یافت. این یافته ها اهمیت توجه به استرس مزمن را به عنوان عامل مؤثر در مدیریت اختلالات خودایمنی تأکید می کنند (۱۷). مولتیپل اسکلروزیس^۴ شایع ترین بیماری خودایمنی التهابی CNS است که با ضایعات دمیالینه همراه است. استرس می تواند با اختلال در محور HPA، سیستم سمپاتیک و تولید سایتوکاین ها، پاسخ ایمنی را تغییر داده و شدت MS را افزایش دهد. مطالعات نشان می دهند استرس تغییراتی در نفوسیت ها و سایتوکاین های بیماران MS ایجاد می کند که ممکن است اهمیت بالینی داشته باشد (۱۸). پسوریازیس نوع وولگاریس با اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب و استرس مزمن مرتبط است. شواهد نشان می دهد که سایتوکاین های التهابی و نوروپپتیدها، همراه با محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال، ممکن است واسطه ارتباط بین التهاب سیستمیک، استرس روانی و بیماری های پوستی باشند. افزایش افسردگی و اضطراب در بیماران پسوریازیس احتمالاً ناشی از فرآیند التهابی و استرس مزمن مدیریت بیماری است، که اهمیت کنترل استرس و سلامت روان در بهبود نتایج بالینی را نشان می دهد (۱۹). همانند بیماری های خودایمنی، استرس بر دفاع میزبان علیه سرطان ها، تومورها، بیماری ها و عوامل عفونی نیز تأثیر می گذارد. مبارزه کارآمد و صحیح علیه کنسر، مستلزم حضور و فعالیت تمام جنبه های ایمنولوژیک بدن است. استرس با تأثیر مخرب که بر روی سیستم ایمنی می گذارد، این پاسخ صحیح را سرکوب یا ناهنجار می کند. استرس روانی عامل خطر مهم در شروع و پیشرفت سرطان است. استرس مزمن با ایجاد اختلال ایمنی، التهاب و اختلال متابولیک، سلول های سرکوبگر ایمنی را افزایش و فعالیت سیتوتوکسیک را کاهش می دهد و متاستاز و پاسخ درمانی را مختل می کند. مدیریت استرس می تواند اثرات منفی آن را کاهش داده و نتایج درمانی را بهبود دهد (۲۰). استرس مزمن باعث تغییر در عملکرد ایمنی و التهاب

^۳ (HPA)

^۴ (MS)

بلندمدت استرس مزمن بر سیستم ایمنی، آسیب پذیری در برابر عفونت ها و بروز بیماری های خودایمنی یا نئوپلاستیک به صورت محدود انجام شده است.

با توجه به شواهد فعلی، پیشنهاد می شود مطالعات آینده به سمت طراحی های طولی و کوهورت های بزرگ انسانی سوق پیدا کنند تا بتوان ارتباط علی بین استرس مزمن و تغییرات ایمنی را با دقت بیشتری بررسی کرد. علاوه بر این، بررسی تعامل بین عوامل ژنتیکی، محیطی و رفتاری می تواند به درک عمیق تر مکانیسم های مولکولی و مسیرهای تنظیمی مرتبط با پاسخ ایمنی کمک نماید.

توسعه و به کارگیری ابزارهای استاندارد و معتبر برای اندازه گیری شدت و مدت استرس، همراه با سنجش هم زمان طیف وسیعی از شاخص های ایمنی و التهابی، موجب همگرایی نتایج و افزایش قابلیت مقایسه میان مطالعات مختلف خواهد شد. در نهایت، اجرای مطالعات مداخله ای مبتنی بر کاهش استرس (از طریق روان درمانی، اصلاح سبک زندگی یا مداخلات دارویی) و ارزیابی اثرات آن بر شاخص های ایمنی، می تواند افق های جدیدی در پیشگیری و مدیریت بیماری های مرتبط با استرس مزمن بگشاید.

نتیجه گیری

استرس مزمن یک محرک سیستمیک است که از طریق محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال^۵ و سیستم عصبی سمپاتیک باعث افزایش ترشح هورمون های استرسی مانند کورتیزول و نوراپی نفرین می شود. این هورمون ها اثرات دوگانه روی سیستم ایمنی دارند:

- (۱) ایجاد یا تشدید خودایمنی: استرس مزمن باعث تحریک بیش از حد برخی مسیرهای التهابی و تولید سایتوکاین های پروالتهابی (IL-6، TNF- α ، IL-1 β) می شود که می تواند باعث فعال شدن خودکار لنفوسیت های T و B علیه بافت های خودی گردد. این فرآیند منجر به تشدید بیماری های خودایمنی مانند پسروریازیس و مولتیپل اسکلروزیس می شود.
- (۲) کاهش پاسخ ایمنی ضد عفونت و ضد تومور: در مقابل، استرس مزمن می تواند پاسخ های ایمنی محافظتی را سرکوب کند، فعالیت سلول های NK و CD8+ را کاهش دهد و باعث

طولانی مدت می شود که در ایجاد سرطان نقش دارد. مدیریت استرس برای افراد سالم و بیماران سرطانی ضروری است و بررسی داروهایی که مسیرهای پایین دستی این محورهای عصبی-غددی را هدف قرار می دهند، می تواند در پیشگیری یا کاهش اثرات سرطان ناشی از استرس مفید باشد (۲۱). هورمون ها و ناقل های عصبی، با تغییر نوع پاسخ ایمنی از نوع ۱ به نوع ۲، شناسایی و نابودی سلول های سرطانی را کاهش داده و سلول های ایمنی را به تسهیل رشد و گسترش سرطان وادار می کنند. این اثر ممکن است از طریق اتصال نوراپی نفرین به گیرنده های β -آدرنرژیک ایجاد شود و تا حدی با مصرف β -بلوکرها قابل بازگشت است (۲۲). پاسخ به استرس در افراد مختلف متفاوت است و مکانیسم های مولکولی آن به طور کامل شناخته نشده اند. زمانی که فرد نتواند با استرس مقابله کند، یک واکنش زنجیره ای رخ می دهد که منجر به بروز «رفتار بیماری گونه» می شود. در یک مطالعه مروری، تعامل پیچیده بین سیستم عصبی مرکزی، سیستم ایمنی و سیستم غدد درون ریز در پاسخ به استرس مزمن بررسی شد. افزایش IL-1 β به عنوان نشانگر اصلی استرس مزمن، این سیگنال التهابی را به سیگنال عصبی (NE) تبدیل می کند و سپس از طریق هورمون ها مانند کورتیزول و ملاتونین تلاش می شود تا تعادل برقرار شود. در مقاومت به کورتیزول، یک چرخه معیوب شکل می گیرد که موجب افزایش همه این مدیاتورها و اختلال شبکه های CNS، IS و ES می شود. افزایش IL-1 β همچنین می تواند با ملاتونین موجب اختلالات خواب شود. این تعاملات مولکولی می تواند توضیح دهد که چگونه استرس مزمن در پاتوژن بیماری های مختلف نقش دارد (۲۳).

این مطالعه مروری کوتاه، نگاهی جامع به جدیدترین یافته ها در زمینه ارتباط میان استرس مزمن و عملکرد سیستم ایمنی دارد. مرور مطالعات نشان می دهد که تفاوت در روش های سنجش استرس و ارزیابی شدت آن، مقایسه مستقیم نتایج بین پژوهش ها را دشوار می سازد. افزون بر این، استرس مزمن معمولاً با عوامل مؤثری مانند ژنتیک، تغذیه، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و سبک زندگی در تعامل است؛ عواملی که در بسیاری از مطالعات کنترل کامل نشده اند. بیشتر پژوهش های موجود کوتاه مدت بوده و ارزیابی تأثیرات

⁵ (HPA)

سپاسگزاری

مورد ندارد.

تضاد منافع

وجود ندارد.

تغییر تعادل Th1/Th2 شود، که توانایی بدن در شناسایی و از بین بردن پاتوژن‌ها و سلول‌های سرطانی را کاهش می‌دهد. به بیان ساده، استرس مزمن سیستم ایمنی را «بی‌نظم» می‌کند. برخی مسیرهای التهابی بیش‌فعال می‌شوند و برخی مسیرهای محافظتی سرکوب می‌شوند. این همان مکانیسمی است که هم می‌تواند خودایمنی ایجاد کند و هم دفاع علیه عفونت‌ها و تومورها را تضعیف نماید.

References

- Balakin E, Yurku K, Ivanov M, Izotov A, Nakhod V, Pustovoyt V. Regulation of Stress-Induced Immunosuppression in the Context of Neuroendocrine, Cytokine, and Cellular Processes. *Biology*. 2025;14(1):76.
- Snodgrass RG, Jiang X, Stephensen CB, Laugero KD. Cumulative physiological stress is associated with age-related changes to peripheral T lymphocyte subsets in healthy humans. *Immunity & Ageing*. 2023;20(1):29.
- Reed RG, Presnell SR, Al-Attar A, Lutz CT, Segerstrom SC. Life stressors and immune aging: Protective effects of cognitive reappraisal. *Brain, Behavior, and Immunity*. 2023;110:212-21.
- Chaudhary R, Prasad A, Agarwal V, Rehman M, Kumar A, Kaushik AS, et al. Chronic stress predisposes to the aggravation of inflammation in autoimmune diseases with focus on rheumatoid arthritis and psoriasis. *International Immunopharmacology*. 2023;125:111046.
- Liu Y, Tian S, Ning B, Huang T, Li Y, Wei Y. Stress and cancer: The mechanisms of immune dysregulation and management. *Frontiers in Immunology*. 2022; 13 - 2022.
- Zhang C, Zhang Y-P, Li Y-Y, Liu B-P, Wang H-Y, Li K-W, et al. Minocycline ameliorates depressive behaviors and neuro-immune dysfunction induced by chronic unpredictable mild stress in the rat. *Behavioural Brain Research*. 2019;356:348-57.
- Marshall GD, Jr. Psychological stress, immune dysfunction, and allergy: Opportunities for improved patient health. *Annals of Allergy, Asthma & Immunology*. 2020;125(4):365-6.
- Bae Y-S, Shin E-C, Bae Y-S, Van Eden W. Editorial: Stress and Immunity. *Frontiers in Immunology*. 2019;Volume 10 - 2019.
- Di Rosso ME, Sterle HA, Cremaschi GA, Genaro AM. Beneficial Effect of Fluoxetine and Sertraline on Chronic Stress-Induced Tumor Growth and Cell Dissemination in a Mouse Model of Lymphoma: Crucial Role of Antitumor Immunity. *Frontiers in Immunology*. 2018;Volume 9 - 2018.
- Qiao G, Chen M, Bucsek MJ, Repasky EA, Hylander BL. Adrenergic Signaling: A Targetable Checkpoint Limiting Development of the Antitumor Immune Response. *Frontiers in Immunology*. 2018;Volume 9 - 2018.
- Antoni MH, Dhabhar FS. The impact of psychosocial stress and stress management on immune responses in patients with cancer. *Cancer*. 2019;125(9):1417-31.
- Li Y, Yao G, Wang R, Zhu J, Li H, Yang D, et al. Maternal immune activation mediated prenatal chronic stress induces Th17/Treg cell imbalance may relate to the PI3K/Akt/NF-κB signaling pathway in offspring rats. *International Immunopharmacology*. 2024;126:111308.
- Alotiby A. Immunology of Stress: A Review Article. *Journal of Clinical Medicine*. 2024;13(21):6394.
- Mohr DC. Stress and multiple sclerosis. *Journal of Neurology*. 2007;254(Suppl 2):II65-II8.
- Schwetlik SN, Baldock KL, Hill CL, Ferrar K. Chronic stress and arthritis: a scoping review. *Arthritis care & research*. 2022;74(6):982-96.

16. Rousset L, Halioua B. Stress and psoriasis. *International journal of dermatology*. 2018;57(10):1165-72.
17. Chaudhary R, Azam MA, Dowand B, Singh A, Rehman M, Agarwal V, et al. Chronic stress-mediated dysregulations in inflammatory, immune and oxidative circuitry impairs the therapeutic response of methotrexate in experimental autoimmune disease models. *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*. 2025;398(4):4305-34.
18. Zapanti E, Dermentzoglou A, Kazakou P, Kilindireas K, Mastorakos G. The role of the stress adaptive response in multiple sclerosis. *Frontiers in Neuroendocrinology*. 2025;78:101204.
19. Keenan EL, Granstein RD. Proinflammatory cytokines and neuropeptides in psoriasis, depression, and anxiety. *Acta Physiologica*. 2025;241(3):e70019.
20. Zhang L, Pan J, Chen W, Jiang J, Huang J. Chronic stress-induced immune dysregulation in cancer: implications for initiation, progression, metastasis, and treatment. *Am J Cancer Res*. 2020;10(5):1294-307.
21. Dai S, Mo Y, Wang Y, Xiang B, Liao Q, Zhou M, et al. Chronic Stress Promotes Cancer Development. *Front Oncol*. 2020;10:1492.
22. Tausk F. Psychoneuro-oncology: How chronic stress grows cancer. *Clinics in Dermatology*. 2023;41(1):95-104.
23. Zefferino R, Di Gioia S, Conese M. Molecular links between endocrine, nervous and immune system during chronic stress. *Brain and Behavior*. 2021;11(2):e01960.



Chronic Stress and Its Impact on the Immune System, Susceptibility to Infections, and Cancers: A Narrative Review

Mohammad Bahrami(MSc)¹, Masoud Hassanzadeh Makoui(PhD)²

Review

Abstract

Background: Chronic stress is one of the major factors affecting public health. By inducing persistent physiological alterations, it not only influences psychological well-being but also plays a pivotal role in weakening immune function. This study aimed to review and analyze the latest scientific evidence on the association between chronic stress, immune responses, and the body's vulnerability to infections and cancers.

Methods: This study was conducted as a narrative review. Relevant data were collected through a systematic search of reputable databases including PubMed, Scopus, and Web of Science over recent years, using the keywords chronic stress, immune function, infection, and cancer. English and Persian full-text articles containing immunological data were included, and the findings were qualitatively extracted and analyzed.

Results: Evidence indicates that chronic stress disrupts the hypothalamic–pituitary–adrenal (HPA) axis and chronically activates the sympathetic nervous system, leading to dysregulation of stress hormones and suppression of immune function. These alterations result in increased systemic inflammation, greater susceptibility to autoimmune diseases, reduced resistance to infections, and heightened cancer risk. Moreover, chronic stress impairs the function of microglial and astrocyte cells in the brain, contributing to anxiety- and depression-like behaviors. Prenatal stress may also activate the PI3K/Akt/NF-κB signaling pathway and disrupt the Th17/Treg balance in offspring, leading to long-term immunological consequences.

Conclusion: Chronic stress induces systemic inflammation, suppresses protective immune responses, and promotes autoimmune processes, thereby increasing susceptibility to infections and cancers. A deeper understanding of the neuro-immune mechanisms underlying chronic stress could pave the way for the development of effective preventive and therapeutic interventions to enhance public health

Keywords: Chronic stress, Immunology, Cancer, Infection, Autoimmunity

***Corresponding author:** Dr. Masoud Hassanzadeh Makoui - E-mail address: dr.m.makoui@zums.ac.ir
 TEL: 02433140300

1-Student Research Committee, Department of Immunology, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

2-Department of Immunology, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

Received: 2025/08/25

Revised: 2025/09/26

Accepted: 2025/10/08